

IEZ 2: Štylizácia vysoko bylinnej prérie s prvkami monokultúrnych driftov

značka		kvitnutie	výška/cm	počet (ks)
	<i>Calamagrostis x acutiflora</i> 'Waldenbuch'	VI-VIII	80-130	24
	<i>Cornus mas</i>	III	300	15
	<i>Crambe cordifolia</i>	VI-VII	80-180	3
	<i>Euphorbia palustris</i> 'Teichlaterne'	IV-VI	50-60	5
	<i>Euphorbia palustris</i> 'Teichlaterne'	IV-VI	50-60	30
	<i>Panicum virgatum</i> 'Heavy Metal'	VIII-IX	80-130	12
A	<i>Aster ptarmicoides</i> 'Major'	VIII-IX	60	70
CA	<i>Calamintha nepeta</i>	VI-VIII	40-60	67
CE	<i>Centaurea montana</i>	V-VI	40-50	10
CE	<i>Campanula persicifolia</i>	VI-VII	80-100	45
CE	<i>Aquilegia vulgaris</i>	V-VI	50-60	36
CE	<i>Anemone Japonica-Hybride</i> 'Prinz Heinrich'	IX-X	90-120	17
E	<i>Euphorbia seguieriana</i> subsp. <i>niciciana</i>	VI-X	40-60	52
H	<i>Hemerocallis</i> (č.9 ; č.1; č.14; č.18; č.19; č.7)	VI-VIII	80	65
I	<i>Iris sibirica</i>	V-VI	50	113
L	<i>Lysimachia cletroides</i>	VII-IX	60-80	30
LI	<i>Lysimachia punctata</i>	VI-VII	50-60	20
N	<i>Nepeta x faassenii</i> 'Six Hills Giant'	V-VII	80-90	43
PL	<i>Platycodon grandiflorus</i>	VII-VIII	50	36
SIL	<i>Silene dioica</i>	IV-VII	60	114
SO	<i>Solidago hybrida</i> 'Strahlenkrone'	VII-VIII	50-60	65
ST	<i>Stachys grandiflora</i> 'Superba'	VII-VIII	50	14

plocha Osadenie zmesí trvaliek

- A SIL10 + H (č.9)8 + N12 + E10
- B SIL15 + H (č.1)11 + SO30 + LI20
- C SIL20 + I32 + CE65 + PL36
- D H (č.14)7 + N9 + E12
- E SIL10 + H (č.18)8 + SO15 + L22
- F I18 + ST3 + A20 + CA10
- G SIL24 + I35 + ST8 + A25 + CA30
- H SIL25 + H (č.19)18 + N22 + E30
- I I28 + ST3+ A 25 + CA27
- J SIL10 + H (č.7)13 + SO20 + L8